

Reproductive Health Initiative for  
Youth in the South Caucasus



This Engagement is co-funded by the European Union



United Nations  
Population Fund



ԻՆՉՊԵՍ ԽՈՒՄՈՒՆԵԼ ԱՆՅԱԿԱՆԻ

ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆԻՅ



ՇՏԱՊ ԲԵՂՄՆԱԿԱՆԻՄԱՆ ՄԻՋՈՅՆԵՐ

 **IPPF** International  
Planned Parenthood  
Federation 

«ԴԱՄՈՒՆ ԸՆՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌՈՂՐԳՈՒԹՅԱՆ» ՀԱՄԱԲԱՏԱԿԱԿԱՆ ԱՄԹԻՎՈՒԿ  
IPPF-ի ՀԱՎԱՏԱՐԱՐՈՎԱԾ ԱՆՂԱՄ

 ԼԻՆՇՆԵՔ ԻՐԱԶԵԿ, ԱՊՐՇՆԵՔ ԱՌՈՂԶ

Եթե ունեցել եք չպաշտպանված սեռական ակտ, այսինքն՝ սերս առանց բեղմնականիսի միջոցի օգտագործման, կամ եթե կարծում եք, որ Ձեր բեղմնականիսի չի գործել, կարող եք օգտագործել շրապ բեղմնականիսման միջոց (ՇԲ): Շրապ բեղմնականիսման միջոցները անվտանգ և արդյունավետ են չպաշտպանված սեռական ակտից հետո հղիությունը կանխելու համար: Կա շրապ բեղմնականիսման երկու միջոց.

- Շրապ բեղմնականիսման հորմոնալ միջոց (հայտնի է որպես շրապ բեղմնականիսման հաբ):
- Ներարգանդային պարույր, որն ամենից արդյունավետն է:

Եթե արագ գործեք, շրապ բեղմնականիսումը կկանխի հղիությունը:

## 1. Շրապ բեղմնականիսման հաբեր

**Ինչ են շրապ բեղմնականիսման հաբերը, և ինչպես են դրանք ներգործում**

Շրապ բեղմնականիսման հաբերը (ՇԲՆ), որոնք հայտնի են նաև որպես հղիության վերահսկման և «հաջորդ առավոտյան» բեղմնականիսիչներ, ավելի քան 30 տարի է, ինչ գործածության մեջ են:

ՇԲՆ-ները պարունակում են հորմոններ, որոնք առկա են պտղաբերության վերահսկման հաբերում և կանխում են հղիությունը՝ դադարեցնելով ձվազարումը և բեղմնավորումը: Տեսականորեն ՇԲՆ-ները կարող են նաև կանխել իմպլանտացիան, բայց դա գիտականորեն չի ապացուցվել:

ՇԲՆ-ների որոշ ռեժիմներ օգտագործում են «կոմբինացված հաբեր»՝ էստրոգենի և պրոգեստինի սինթետիկ հորմոններով, ինչպիսիք արտադրում է կնոջ օրգանիզմը: Մյուսները միայն պրոգեստին պարունակող հաբեր են:

ՇԲՆ-ները վիժում չեն առաջացնում և չեն ազդում հղիության վրա: Այնուամենայնիվ, կինը չպետք է շրապ բեղմնականիսման միջոցներ օգտագործի, եթե հղի է:

## Երբ են անհրաժեշտ հաբերը

ՇԲՆ-ն կարևոր գործիք է երիտասարդ կնոջ համար անցանկալի հղիությունը և արհեստական վիժման անհրաժեշտությունը կանխելու համար: Դուք կարող եք ՇԲՆ օգտագործել, երբ.

- Պահպանակը պատրվել կամ սահել է, և սերմնազարումը տեղի է ունեցել հեշտոցի ներսում:
- Դուք մոռացել եք ընդունել Ձեր բեղմնականիսիչ հաբերը:
- Դուք սխալ եք հաշվել Ձեր «ապահով» օրերը:
- Նա ժամանակին դուրս չի հանել:
- Դուք բեղմնականիսման որևէ միջոց չեք օգտագործել:
- Նա ստիպել է Ձեզ ունենալ չպաշտպանված վազինալ սեռական ակտ:

## Արդյունավետություն

Միայն պրոգեստին պարունակող ՇԲՆ-ները հղիության ռիսկը նվազեցնում են 89 տոկոսով, եթե դրանք օգտագործվում են սեռական ակտին հաջորդող 72 ժամվա ընթացքում: Օրինակ՝ 100 կնոջից 8-ը հղիանում են իրենց ցիկլի երկրորդ կամ երրորդ շաբաթվա ընթացքում՝ մեկ անգամ չպաշտպանված սեքսից հետո: Բայց 100 կանանցից միայն 1-ը կհղիանա պրոգեստին պարունակող ՇԲՆ ընդունելուց հետո:

Կոմբինացված ՇԲՆ-ները հղիության ռիսկը նվազեցնում են 75 տոկոսով, եթե դրանք օգտագործվում են սեռական ակտին հաջորդող 72 ժամվա ընթացքում: 100 կանանցից միայն 2-ը կհղիանան կոմբինացված ՇԲՆ ընդունելուց հետո:

Շրապ բեղմնականիսումը նախատեսված է միայն որպես պահեստային բեղմնականիսիչ: ՇԲՆ-ն այնքան արդյունավետ չէ, որքան ներարգանդային պարույրը, հաբի կամ պահպանակի ճիշտ և հետևողական օգտագործումը: ՇԲՆ-ները չեն շարունակում կանխել հղիությունը ցիկլի մնացած փուլերի ընթացքում: Ուստի պետք է օգտագործել բեղմնականիսիչ այլ միջոցներ:

Շտապ բեղմնականիչները որևէ կերպ չեն պաշտպանում սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներից: Այդ իսկ պատճառով ճիշտ կլինի, եթե Դուք բժշկական հետազոտություն անցնեք սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակի ստուգման նպատակով, եթե, հնարավոր է, ռիսկի եք ենթարկվել չպաշտպանված սեռական հարաբերություն ունենալով:

### ***Երբ է պետք սկսել հարերի ընդունումը***

Նոյություն ունեցող նվազեցնելու նպատակով ՇԲՆ-ների ընդունումը պետք է սկսել չպաշտպանված սեռական ակտին հաջորդող 120 ժամվա (5 օրվա) ընթացքում: Որքան շուտ սկսեք ընդունումը, այնքան լավ: ՇԲՆ-ները 75-89 փոկոսով նվազեցնում են հղիության ռիսկը, եթե դրանց ընդունումը սկսեք 72 ժամվա ընթացքում:

### ***Ինչպես ընդունել հարերը***

Միայն պրոգեստին պարունակող հարերը կարելի է ընդունել մեկ կամ երկու չափաբաժնով (դոզա)՝ 12 ժամ ընդմիջմամբ: Կոմբինացված հորմոններով հարերը պետք է ընդունել երկու չափաբաժնով՝ 12 ժամ ընդմիջմամբ: Մեկ չափաբաժնում եղած հարերի թիվը պայմանավորված է հարերի արտադրարեսակով: Երկու չափաբաժնի դեպքում էլ ընդունե՛ք միևնույն արտադրարեսակին պատկանող հարեր: Առաջին չափաբաժնի հարերը կո՛ր պվեք չպաշտպանված սեքս ունենալուց հետո առաջին իսկ հնարավորության դեպքում՝ 120 ժամվա (հինգ օրվա) ընթացքում: Եթե հարերն ընդունում եք երկու չափաբաժնով, երկրորդ դոզան ընդունե՛ք առաջին ընդունելուց 12 ժամ անց:

### ***Կողմնակի ազդեցությունը***

ՇԲՆ-ներ օգտագործած միլիոնավոր կանանց մոտ որևէ լուրջ բարդությունների դեպքեր չեն գրանցվել: ՇԲՆ-ների հաճախակի օգտագործումը կարող է առաջացնել դաշտանային ցիկլի անկանոնություն և անկանխատեսելիություն:

ՇԲՆ-ների օգտագործումը կարող է առաջացնել սրտխառնոց և

փսխում: Ռիսկն այս դեպքում ավելի մեծ է կոմբինացված հարերի, քան միայն պրոգեստին պարունակող հարերի դեպքում: Սրտխառնոցի ռիսկը նվազեցնելու համար կարող եք ՇԲՆ ընդունելուց մեկ ժամ առաջ օգտագործել սրտխառնոցի դեմ դեղամիջոց: Եթե առաջին չափաբաժնից հետո Ձեզ մոտ եղել է փսխում, անպայման հակասրտխառնոցային դեղամիջոց օգտագործե՛ք երկրորդ չափաբաժինն ընդունելուց մեկ ժամ առաջ: Կամ երկրորդ դոզան կարող եք ընդունել որպես ներհեշտոցային մոմիկ՝ հարերը մաքսնելով քեղադրելով որքան հնարավոր է խոր հեշտոցի ներսում:

Երկրորդ չափաբաժնից հետո փսխման դեպքում մի՛ ընդունեք լրացուցիչ հարեր: Դրանք հավանաբար չեն նվազեցնի հղիանալու ռիսկը, սակայն կարող են սպառնալիկ հետ կապված խնդիրներ առաջացնել:

ՇԲՆ-ները կարող են նաև առաջացնել կրծքագեղձերի ժամանակավոր գերզգայնություն, անկանոն արյունահոսություն, գլխապտույտ և գլխացավ:

### ***Ինչ կլինի հարերն ընդունելուց հետո***

- Նախքան ընդունելուց հետո դաշտանային ցիկլը կարող է սկսվել ավելի վաղ, քան սովորաբար:
- Արյունահոսությունը կարող է լինել ավելի առաք, թեթև, քսվող բնույթի կամ սովորականի նման:

Նախքան Ձեր մյուս դաշտանային ցիկլը խորհրդակցե՛ք բուժաշխատողի հետ՝ քննարկելու, որ ՇԲՆ եք ընդունել: Լրացուցիչ հանդիպում նշանակե՛ք Ձեր բժշկի հետ, եթե երեք շաբաթվա ընթացքում Ձեզ մոտ դաշտան չի սկսվում, կամ ի հայտ են գալիս հղիության նշաններ: Անպայման օգտագործե՛ք բեղմնականիչ միջոց, եթե վազինալ սեռական ակտ եք ունենում Ձեր մյուս ցիկլին նախորդող ժամանակահատվածում: Շարունակե՛ք օգտագործել Ձեր ընտրած բեղմնականիչ միջոցն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուզում եք խուսափել հղիությունից:

## **ՇԲՆ-ների ձեռքբերումը**

«Postinor»-ը ՇԲՆ-ի տեսակ է, որը ներկայումս կարելի է ձեռք բերել դեղատոմսերում: Կարող եք Ձեր բժշկին խնդրել, որ նա դեղատոմս գրի, նախքան Ձեզ անհրաժեշտ կլինի ՇԲՆ-ներ օգտագործել: դա Ձեզ հնարավորություն կտա ՇԲՆ-ներ օգտագործել շտապ իրավիճակներում՝ ստիպված չլինելով սպասել, որ հանդիպում նշանակվի բժշկի հետ:

## **2. Ներարգանդային պարույրի տեղադրում**

Բժիշկը կարող է հղիությունը կանխելու նպատակով չպաշտպանված սեռական ակտին հաջորդող հինգ օրվա ընթացքում տեղադրել ՆՊ՝ որպես շտապ բեղմնականիսման միջոց: ՆՊ-ի նման տեղադրումը հղիանալու ռիսկը նվազեցնում է 99.9 տոկոսով:

Այնուամենայնիվ, ՆՊ-ի օգտագործումը խորհուրդ չի տրվում դեռահասներին, որոնց մոտ առկա է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկը տեղադրման պահին, ներառյալ նրանք, որոնք բռնաբարության են ենթարկվել:

Որպես բեղմնականիսիչ միջոց՝ ՆՊ-ի կողմնակի ազդեցությունը, օգտագործման առավելություններն ու թերությունները նույնն են, ինչ այն որպես բեղմնականիսման շարունակական միջոց օգտագործելիս:

## **3. Ինչպես ստանալ աջակցություն և տեղեկատվություն**

Ձեզ անհրաժեշտ է ստանալ մանրամասն տեղեկատվություն, թե ինչպես խուսափել անցանկալի հղիությունից օգտագործելով շտապ բեղմնականիսման միջոցներ: Ուզում եք տեղեկություններ ձեռք բերել բեղմնականիսման այլ մեթոդների՝ վերաբերյալ: Կամ կարծում եք, որ Ձեր մեթոդը չի գործել, և հնարավոր է՝ հղի եք ու օգնության կարի՞ք ունեք:

Դիմե՛ք փորձառու բժիշկ-մասնագետի կամ Երևանում գործող «Նանուն ընդանիքի և առողջության» համահայկական ասոցիացիայի երիտասարդական կենտրոնի վերապարաստված խորհրդատուներին և ուսուցանողներին: Նրանք կարող են տրամադրել տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և աջակցություն: Նանդիպում նշանակելու համար զանգահարե՛ք՝ **(374 10) 52-61-87, 65-36-65** կամ այցելե՛ք:

Երևան, Վարդանանց փ. 14/1

Էլ. փոստ՝ [armfha@netsys.am](mailto:armfha@netsys.am)

Նարավային Կովկասում Երիտասարդության Վերարտադրողական Առողջության Նախաձեռնությանը մանրամասն ծանոթանալու համար դիմե՛ք մեր կայքին՝ [www.4uth.am](http://www.4uth.am):